



STODAL®

XAROPÉ

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar STODAL, xarope com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Neste folheto:

1. O que é STODAL, xarope e para que é utilizado
2. Antes de tomar STODAL, xarope
3. Como tomar STODAL, xarope
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar STODAL, xarope
6. Outras informações

1. O QUE É STODAL, xarope E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento sintomático da tosse.

2. ANTES DE TOMAR STODAL, xarope

Não tome STODAL, xarope

Se tem alergia às substâncias ativas ou a qualquer outro componente de STODAL, xarope.

Tome especial cuidado com STODAL, xarope

Este medicamento contém 1,18 % v/v de etanol (álcool).

Uma dose de 5 ml contém 0,046 g de etanol e 3,74 g de sacarose.

Uma dose de 15 ml contém 0,139 g de etanol e 11,21 g de sacarose.

- Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com diabetes mellitus.
- Prejudicial para os indivíduos que sofrem de alcoolismo.
- Para ter em consideração quando utilizado em mulheres grávidas ou a amamentar, crianças e em grupos de alto risco tais como doentes com problemas de fígado ou epilepsia.

Tomar com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

Informações importantes sobre alguns componentes de STODAL, xarope

Excipientes de efeito notório: sacarose, etanol.

3. COMO TOMAR STODAL, xarope

Via oral.

Adultos: 1 dose de 15 ml com a ajuda do

copo doseador 3 a 5 vezes por dia.

Crianças: 1 dose de 5 ml com a ajuda do copo doseador 3 a 5 vezes por dia.

Se tomar mais STODAL, xarope do que deveria

Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar STODAL, xarope

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar STODAL, xarope

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, STODAL, xarope pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR STODAL, xarope

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize STODAL, xarope após o prazo de validade impresso na caixa.

Não utilize 1 ano após a primeira abertura do frasco.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de STODAL, xarope

Para 100 g de xarope:

Anemone pulsatilla 6 CH	0,95 g
Rumex crispus 6 CH	0,95 g
Bryonia dioica 3 CH	0,95 g
Ipecacuanha 3 CH	0,95 g
Spongia tosta 3 CH	0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH	0,95 g
Antimonium tartaricum 6 CH	0,95 g
Coccus cacti 3 CH	0,95 g
Drosera 3 CH	0,95 g

Os outros componentes são: xarope de tolu, xarope de polygala, xarope de sacarose, caramelo, ácido benzóico, etanol 96% v/v.

Qual o aspecto de STODAL, xarope e conteúdo da embalagem

Xarope, frasco de 200 ml e um copo doseador.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado/Fabricante

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

França

Este folheto foi aprovado pela última vez em 09/2013

